(2) 津波波源モデル・震源断層モデルの構築

津波堆積物の調査

担当：卜部厚志(新潟大学)

日本海側での津波堆積物調査

地形・地震環境の特徴(太平洋沿岸との相違)

- 波源モデルが未解明

(太平洋側より, 津波規模と頻度が少ない: 予測)

- 砂丘列の発達(標高10~20m)

浜堤を全面的に乗り越えない

- 河川遡上・氾濫, 河口部から内陸への氾濫

洪水堆積物との識別方法の確立

- 津波の史料の不足

江戸後期以前の確実な史料がない

地形環境に対応した津波堆積物を認定していく必要がある

新潟県内を中心とした津波堆積物の検討例

- 1741年 渡島大島
相川・海府：浸水，鷺崎：半数流出，両津：船被害
- 1762年 佐渡沖
願村：全戸流出，鶴島村：26戸流出
- 1833年 庄内沖地震
岩谷口（相川）：遡上高6.4m，角田浜：遡上高6.4m
- 1940年 神威岬地震
佐渡：小被害
- 1964年 男鹿半島沖
佐渡：被害なし（津波波高：両津40cm）
- 1964年 新潟地震
津波波高：両津300cm
- 1983年 日本海中部地震
津波波高：両津144cm，鷺崎143cm
- 1993年 北海道南西沖地震
津波波高：両津165cm，小木60cm

最上トライ

両津・加茂湖

佐渡での津波被害記録

加茂湖周辺の地形

加茂湖：海跡湖

面積：4.95Km²；水深8m

流入河川：小規模

湖岸の低平地で粗粒物をトラップ

KAM-1

KAM-2

KAM-3

イベント(津波)堆積物の認定

津波堆積物

葉理の発達した砂層

植物片の濃集

津波堆積物

懸濁状態からの沈殿した泥層

葉理の発達した砂層

イベント堆積物の対比 (T14: 約5300年前)

KAM-2

←海側

KAM-1

17cm

f-vf
well-sort

約1km

1.5cm

f-vf well-sort

約1km

イベント堆積物

*** 年代誤差幅で一致**

海側から内陸側に薄層化

あるいは変化しない

粒度変化: やや細粒化

淘汰度: ほとんど変化ない

イベント = 津波

KAM-3 内陸側→

0.5cm

vf-f: well-sort

加茂湖の堆積物による津波履歴

- ・歴史記録(1964年, 1833年, 1762年or1741年)

KAM-1:0.23m→modern 新潟地震

KAM-1:1.42m→1713AD- 1868AD 1833年庄内沖

KAM-1:2.02m→1589AD- 1788AD 1762or1741

9000年で26層

- 3地点(2地点)に認められる堆積物の年代(BP:中央値)

980, 1750, 2170, 2750, 3210, 3590, 4010,
4330, 4760, 5120, 5400, 5880, 6420, 6490,
6660, 7000, 7630, 7770, 7800, 8010, 8580,
8740, 8810

発生間隔:30-790年:周期的ではない

日本海北部の津波発生履歴の指標となる

旧岩船瀉における津波堆積物

6000年で5層
(9000-3000年)

津波堆積物の可能性の高い
淘汰のよい砂層

加茂湖と旧岩船潟に共通する津波堆積物

加茂湖

岩船潟

	KAM-1				KAM-2				KAM-3			
	深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)		深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)		深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)	
T7*	6.36	A	2939	2803					8.4	A	2708	2562
T8					5.56	A	3258	3117	9.84	A	3311	3149
T12	10.55	A	4895	4800	7.25	C	4734	4595				
T13	11.15	A	5133	5041					12.45	B	5198	5093
T19					12.81	A	7134	7016	17.75	A	7016	6813
T19.5									18.58	B	7298	7113
T21	18.03	A	7895	7812	14.21	A	7866	7757	20.21	A	7703	7558
T23					15.19	A	8013	8053	22.4	A	8051	7898
T24	20.98	A	8805	8584	17.05	A	8566	8546	23.8	C	8593	8372

	IWF-1				IWF-2				IWF-3			
	深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)		深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)		深度(m)	確実度	堆積物の年代 (年前)	
IWF-T1					2.14	B	2927	2795	1.43	B	2897	2761
					2.74	A	3356	3210				
					3.44	A	4766	4620				
IWF-T2	7.04	AA	7175	6984	8.2	B	7158	7041	4.12	B-C	7131	7010
IWF-T3	8.06	C	7192	7007	8.62	C	7251	7149				
					11.93	D	7825	7661	12.15	D	7967	7845
IWF-T4	13.58	D	8087	7931	13.4	C	8148	8017				
IWF-T5	17.34	A	8637	8514	16.94	B	8664	8494				

共通のイベントが多数ある

津波堆積物の堆積モデルの構築(検討中)

砂質タイプ

- * 遡上方向へ細粒化
- * 双方向の堆積構造
- * 海浜から数km程度まで分布

これまでに多くの検討
堆積モデルがある

礫質タイプA

- * 遡上方向へ急激に細粒化
- * 砂質タイプよりは内陸まで分布しない
- * 冬期の暴浪プロセスとの識別

層相変化の予測は可能
堆積モデルは未構築

礫質タイプB (崖錐斜面)

- * 崖錐の巻き込み
- * 海浜起源の礫の混在
- * 海浜礫と崖錐礫の含有比率の変化
- * 崖錐堆積物との区分

層相変化の予測は可能
堆積モデルは未構築

佐渡・海岸部での津波堆積物(礫層)

冬期の波浪とは異なる
海浜背後の堆積環境

飛島(山形)での津波堆積物

- 9世紀と10世紀に連続して津波がある
(佐渡, 新潟市内, 飛島)

10世紀

9世紀

⇒2-1-2グループは、いろいろなタイプの津波堆積物に対応できる

平成25年度の調査：若狭湾沿岸（福井県）

沿岸低地におけるボーリング調査（簡易，機械）

○定方位サンプラーによる掘削

⇒砂の粒子配列測定による古流向の復元

○粒度・年代・微化石等の分析

海岸露頭の調査

H26年度(石川・富山)にむけて

歴史での既往最大津波(1833年庄内沖)の波源域の推定

1833年天保庄内沖と1964年新潟地震の波源域が重複している. 重複は考えにくい.

1833年天保庄内沖の波源域 ⇒もっと沖合に推定(松浦ほか, 2011)

波源域でのセグメント区分 / セグメントの連動はあるのか?

1833年庄内沖地震の遡上範囲の復元